

まんまるはーと月形町



旬の新鮮情報



2008年5月号

新規就農者激励式

(左) 今井さん 右 柴田組合長



5月のこよみ

—— (大) 皐月 (さつき) ——

早苗の植えつけをする月の意味です

- 1日【メーデー】国際的な労働者の祭典
- 3日【憲法記念日】日本国憲法の施行を記念する祝日
- 4日【みどりの日】
- 5日【こどもの日】端午の節句
- 11日【母の日】子供達が母の愛を褒め称え感謝する日
- 31日【世界禁煙デー】

今月の行事予定

- 13日 ・ 臨時理事会
- 27日 ・ 第4回 理事会



▲スタンドタンクローリーが新しくなりました。
日野 排気量6.4㍑ 積載量4,000㍑



▲「月形の花」共同輸送開始
4月20日、共同輸送が始まりました。

JA 青年部 女性部 に参加 しませんか？

JA 青年部・女性部では、農業・農村に元気にする活動を行っています。

例えば、JA 青年部は、農業技術研修会や部員相互の親睦を行う交流会やJA 女性部は、「かざぐるま」で野菜などの販売やアレンジフラワー講座などまだまだ、他にもいろいろな活動を行っていますので、部員になりたい方やちょっと参加してみたい方は、地域の部員又は事務局までお気軽に声をかけて下さい。

事務局 業務部営農推進課 電話 53-3400



新規就農激励状が授与されました



今井伸幸氏
(三十五歳)

就農年月 平成十九年四月

●就農理由

「自分自身で何かを始めたかった事もあり、外で働く仕事、生き物に係のある仕事がしたかった」花が好きで奥さんの影響もあり、最初から就農するなら「花き」と決めていたそうです。

●就農してから思うこと

「市場を視察した際、市場から消費者へ買われて行く時がうれしく思えた瞬間」又、実習中と就農してからの違いに苦労した事もあったそうです。

●農業の魅力

「一生懸命努力した分、必ず結果として成果がでる事が一番の魅力であると感じる。全てが期待通りとは行きませんが…」

●抱負


今年福岡の市場へ行った時、「今まで「花き」を作り続けてきた生産者の努力と「月形の花」の歴史を感じ、努力されている花き生産者を見習って、自分もそうなれるよう頑張りたい。」と話していました。

JA 青年部部員研修会

四月十一日、JA 大会議室において、「土壌分析結果を基にした施肥設計」と題して部員研修会を開催しました。

講師には、空知農業改良普及センター山田係長、平門普及員を招き、資料を基に解説とアドバイスを受けました。

出席した青年部員は、技術向上に向け積極的に質問を行っていました。



一、十分な換気で健苗育成
育苗後半では、徒長防止と苗の硬化に努めましょう。高温管理を避け、苗を十分外気に慣らしましょう。育苗後半の高温管理は早期異常出穂の原因となります。特に早生品種は、感温性が高く、状況によっては遮光資材を使用し温度の上昇を回避します。温度の上昇と葉面からの蒸散により乾燥が進むため十分なかん水で苗質の低下を防止します。

二、移植時期は葉数で決定
育苗日数は、中苗で30日、成苗で35日程度（大地の星は30日程度）を目安とします。中苗では3.1葉、成苗では3.6葉を超えた時点で移植します。（早生品種は3.1〜3.5葉を目安にします）万が一、天候不順などで育苗日数がのびる場合は次のことを徹底してください。

・適正な追肥の実施
・ハウス内の温度は20℃以下に維持する
・葉面からの水分の蒸散が多くなります。曇りや雨の日以外にはかん水を実施する
また、本田での生育期間の確保のため、気象条件を考慮し5月15〜25日の間に移植を終わらせませす。晩霜に注意をし移植後、天候不順の場合は苗が水浸しない程度の深水とし、苗を保護します。

三、移植は初期茎数確保の鍵
移植は稲作りで最も忙しい作業ですが、

水稲

今年は、融雪が早くほ場の準備は万全の体制で臨まれていると思います。今月の作業は、育苗から移植までと、出来秋に左右する大切な作業です。着実な技術の励行で安定した稲作を進めましょう！

表1. 全層及び、全層+側条窒素施肥例 (kg/10a)

適応地帯	主な土壌	ほしのゆめ・なつぼし・きら5397 など			大地の星		
		目標収量 (kg/10a)	全層・側条割合 総量 全層 側条	目標収量 (kg/10a)	全層・側条割合 総量 全層 側条	目標収量 (kg/10a)	全層・側条割合 総量 全層 側条
岩見沢市 三笠市 月形町	褐色低地土	510	7.5 3.5 4.0	570	9.5 5.5 4.0	570	9.5 5.5 4.0
	グライ土	510	7.0 3.0 4.0	570	9.0 5.0 4.0	570	9.0 5.0 4.0
	泥炭土	510	5.5 1.5 4.0	570	7.5 3.5 4.0	570	7.5 3.5 4.0
	台地土	480	6.5 2.5 4.0	540	8.5 4.5 4.0	540	8.5 4.5 4.0
美幌市	褐色低地土	540	8.0 4.5 3.5	600	10.0 6.5 3.5	600	10.0 6.5 3.5
	グライ土	540	7.5 4.0 3.5	600	9.5 6.0 3.5	600	9.5 6.0 3.5
	泥炭土	540	6.0 2.5 3.5	600	8.0 4.5 3.5	600	8.0 4.5 3.5
	台地土	510	7.0 4.0 3.0	570	9.5 6.0 3.0	570	9.5 6.0 3.0

注) 1. 各土壌、リン酸施肥量8〜9kg/10a、加里施肥量8〜9kg/10a
注) 2. 北海道施肥ガイドより加筆

初期生育が良好で生育中期以降肥切れが予想される褐色低地土では、全層施肥の比率を高くします。一方、初期生育が悪いあるいは、中・後期土壌窒素発現の多いグライ土、泥炭土では側条施肥の比率を高くします。また、地帯区分では、生育不安定地帯ほど側条施肥比率を高める必要があります(表1)

四、土壌にあった施肥を

一、除草
ハコベ (ナデシコ科)・イヌカミ ツレ(キク科)など、雑草の発生が目立っています。除草剤の散布が遅れると、麦の生育が旺盛となり、葉液が雑草にかかり、除草効果が低下するので、5月中旬までに終了するようにしましょう。(表1)

表1. 主な除草剤 (秋まき小麦)

除草剤名	使用時期	10aあたり使用量	使用回数	注意事項
エポバート7フロアブル	広葉雑草2〜4葉期 小麦止葉抽出前まで (但し、収穫45日前まで)	50〜75ml	2回以上	雑草の生育が進むと効果が低下する。乳剤との混用や着剤剤は使用しない。
MCPソーダ塩	幼穂形成期 (但し、収穫45日前まで)	200〜300g	1回	日中気温が20℃以上の好天日を選び散布する。
バサグラン液剤	小麦の生育期 雑草の3〜6葉期 (但し、収穫45日前まで)	100〜200ml	1回	雑草が大きくなると効果が劣る。
ハーモニー75DF水稲剤	幼穂形成期 (但し、収穫45日前まで)	7.5〜10g	1回	使用後のタンクやホース内は速やかに専用洗浄剤で洗浄する。

一、除草
除草剤の散布が遅れると、除草効果が低下するので、必ず適期に散布してください。(表1)

二、赤かび病の防除
「春よ恋」は「ホクシン」に比べ赤かび病に弱いので、開花極始頃に必ず1回目の防除を行い、その後は7日間隔で防除を継続してください。(表5)

表2. 赤さび病の主な農薬

農薬名	使用倍率	適正使用基準	
		使用時期	使用回数
アミスター20フロアブル	2,000〜3,000倍	収穫7日前まで	3回以内

表3. 赤かび病の防除体系列 (秋まき小麦)

	農薬名	使用倍率	適正使用基準	
			使用時期	使用回数
1回目	シルバキュアフロアブル	2,000	収穫14日前まで	2回以内
2回目	トップジンM水和剤	1,000〜1,500	収穫14日前まで	出穂期以降 2回以内
3回目	シルバキュアフロアブル	2,000	収穫14日前まで	2回以内

三、赤さび病・赤かび病の防除
「ホクシン」は赤さび病に弱い品種です。早い時期から発生が見られる場合は防除を行いましょう。(表2)

赤かび病は初回防除のタイミング(開花極始頃)と、その7日後に行う2回目の防除が重要です。時期を逸することなく行いましょう。(表3)

お知らせ

農業経営改善状況調査について

日頃より、本協議会の農業振興につきまして、特段のご配慮を賜りお礼申し上げます。

さて、本協議会では、効果的な支援等を講じるため、認定農業者となられた方の認定期間の中間年(3年)および最終年(5年)において、農業経営改善状況を把握することとしました。つきましては、下記調査対象の農業者の方へ後日調査票を郵送しますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。


記

1. 調査対象

- ・農業経営改善計画認定後の中間年である3年目に係る全ての認定農業者
(H17. 11. 1〜H18. 10. 31の間に認定された農業者)
- ・農業経営改善計画の最終年である全ての認定農業者
(H15. 11. 1〜H16. 10. 31の間に認定された農業者)

月形町担い手育成総合支援協議会

事務局 月形町役場 産業課農政係 電話53-2322
JA月形町 営農推進課 電話53-3400



よくわかる 農業者年金 No. 4

保険料はいくらですか? どのような年金を受け取れますか?

保険料の額は自由に決められる! 年金は生涯受給できる!

保険料は加入者自らが月額2万円〜6万7千円の間で自由に決められ、農業経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。

年金の種類には、①自分が支払った保険料とその運用収入を基礎とする農業者老齢年金と②保険料の国庫補助額とその運用収入を基礎とする特例付加年金があり、原則65歳から生涯支給されます。特に80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額は、死亡一時金として遺族に支給されます。農業者年金は若い時ならお一人の加入で、ある年齢からは夫婦二人の加入で、厚生年金並みや老後生活の安定に役立つ年金額が見込まれます。

農業者年金には、①国民年金の第1号被保険者で、②年間60日以上農業に従事する、③60歳未満の方—ならどなたでも加入できます。

独立行政法人 農業者年金基金

〒105-8010 東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5F
電話: 03(3502)3942 FAX: 03(3592)2660 <http://www.nounen.go.jp>

農業者年金の年金支給額の試算

〈保険料月額2万円で、付利率3%の場合〉

加入年齢	納付期間	年金試算額(月額)			
20歳	40年	男性	113万円	女性	98万円
30歳	30年	男性	71万円	女性	62万円
40歳	20年	男性	40万円	女性	35万円
50歳	10年	男性	17万円	女性	15万円

65歳までの付利率は3%、65歳で裁定した以降の予定利率は1.75%で計算していますが、運用成績により年金額は変動します。



平成20年度 堆肥供給単価の決定について

本年度の堆肥供給単価を下記の通り決定致しましたので、通知致します。

【堆肥単価】（消費税込み）

堆肥種類	供給単価 円/㎡ ①	循環型助成 円/㎡ ②	実質単価 円/㎡ ③=①-②	運賃 円/㎡ ④	合計単価 円/㎡ ⑤=③+④
完熟堆肥	2,709円	1,398円	1,311円	378円	1,689円
半熟堆肥	2,132円	1,398円	734円	378円	1,112円

（注）2tダンプでの配送は運賃、円/㎡当たり914円（税込）となります。

助成内容 循環型クリーン農業助成として、10a当り1トン以上の堆肥を投入した水田を対象として、堆肥購入トン数に1トン当り2,000円を上限として助成します。（平成19年度産地づくり交付金助成内容同様）
注）施工前・施工後の写真撮りが必要。

農業用プラスチック(ビニール他)の処理方法について

受入期間 平成20年5月1日～平成20年10月31日まで
受入場所 月形町衛生センター内堆積場所（月ヶ岡）
受入時間 午前9時から午後5時まで（変更となる事があります。）
但し、毎月第1・第3・第5日曜日は衛生センター休業の為受入は出来ません。

受入料金 （昨年度同額・運賃・税込み）
ビニール類（農ビ） 27円/kg
プラスチック類（農ポリ・肥料袋・ポットバチ等） 32円/kg
フレコン 126円/kg
塩ビ管（灌水パイプ等） 57円/kg
育苗箱類（プラグトレイ等） 32円/kg
農薬容器類（受入日・場所を別途通知します。） 32円/kg

その他 （1）受入料金案内、最終精算等についてはJAが担当致します。
（2）センターでの手続きは従来と変更はありません。
（3）受入料金は受入期間終了後に請求致します。
（4）搬入に際しては、ビニール・農ポリ・フレコンバック等は50kg以内、肥料空袋は30kg以内、水稻育苗箱は10枚以内とし、飛散しないようにしてください。

●注意 汚れのひどい物、ゴム類が混入している物、梱包状態の悪いものについては、受入を拒否する場合があります。また、梱包は十文字にしっかりと縛って下さい。縛りのゆるいものについては、その場で縛りなおしていただきます。
農ビ・農ポリの区分けをして、梱包してください。（農ポリは、ライターで30秒あぶると燃焼します。）
農薬容器の回収は別途通知しますので、衛生センターへは搬入しないでください。

三、倒伏防止
「春よ恋」は「ホクシン」に比べ倒伏に弱いので、生育が旺盛なほ場では、節間伸長抑制剤の使用も考慮してください。なお、節間伸長抑制剤は散布時期がずれると効果が低下するので、必ず適期に使用してください。（表6）

【大豆】

一、は種
は種のポイントは欠株がなく、出芽させることです。
①は種適期は5月中旬頃（地温が10℃以上になる頃ですが、晩霜に注意が必要です）。
②砕土・整地がわるいと欠株の原因になります。（土塊はおおむね2cm位を目安としましょう）

表4. 主な除草剤（春まき小麦）

除草剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	注 意 事 項
MCPソーダ塩	麦の5葉期 (但し、収穫45日前まで)	200～300g	1回	日中気温が20℃以上の好天日を選び散布する。
バサグラン液剤	麦の生育期 雑草の3～6葉期 (但し、収穫45日前まで)	100～200ml	1回	雑草が大きくなると効果が劣る。

表5. 赤かび病の防除体系（春まき小麦）

	農 薬 名	使用倍率	適 正 使 用 基 準	
			使用時期	使用回数
1回目	シルバキュアフロアブル	2,000	収穫14日前まで	2回以内
2回目	トップジンM水和剤	1,000～1,500	収穫14日前まで	出穂期以降2回以内
3回目	シルバキュアフロアブル	2,000	収穫14日前まで	2回以内
4回目	ストロビーフロアブル	2,000～3,000	収穫14日前まで	3回以内

表6. 節間伸長抑制剤の使用法（春まき小麦）

薬剤名	使用時期	使用量(倍率)	散布水量	使用回数	注 意 事 項
サイコセル	6葉期前後 小麦の草丈30～40cm	200ml	100～120L	1回	重複散布はしない。 晴天の日は日中を避け、夕方に散布する。
エスレル10	出穂始期	100～333ml (300～1,000倍)	100L	1回	出穂始期の適期に処理をする。 25Lの少量散布の場合は、専用ノズルを使用する。
		100～200ml (125～250倍)	25L		

※サイコセル：散布時期が遅れると効果が劣る。また、極端な多肥条件では茎が伸長を抑制困難である。
※エスレル10：30%異常の出穂を見てからでは倒伏軽減効果が劣る。

表7. 主な農薬

農 薬 名	処 理 濃 度	対 象 病 害 虫 名				適正使用基準	
		立枯病	炭疽病	タネバエ	アブラムシ	使用時期	使用回数
クルーザーFS30	乾燥種子1kg当り原液6ml	○	○	○	○	は種前	1回
粉衣用ベアースミン	種子重量の0.3%	○	○	○	○	は種前	1回

*クルーザーFS30を塗抹後に粉剤（種子消毒・根粒菌）を粉衣。また、これらの処理は、は種当日又は前日に行う。（処理後は種までの期間があくと発芽立、発芽勢が劣る場合がある）

野菜

【トマト】
一、定植時期
定植は1段花房の花が1輪開花したら行います。中玉系品種やミニトマトなどの一部の品種では開花前定植や全輪開花定植などがありますので注意しましょう。

③コンバイン収穫での栽植密度は10a当たり2万本（2万5千本を目安には種ましましょう。（は種時に種子がほ場へ確実に落ちているか確認しましょう）
④わい化病・タネバエ予防に種子粉衣を実施しましょう（堆肥など有機物資材を春に施用するとタネバエによる被害を助長するので避けましょう。）（表7）

二、定植準備
あらかじめベットをつくりマルチで被覆し地温と水分を確保してから定植を行うようにしましょう。ベット地温は活着根張りを良くするため、13～15℃を確保します。
三、定植
定植時には必ず花房を手前にして植えましょう。そうすると後段になっても花房が手前に来るようになります。定植の深さは地温が確保できている場合は、鉢の深さまで植え、地温が低い場合は、鉢の上面がやや上に出るようにしましょう。苗の生育が進みすぎた場合は、短めのポットで支柱をすりと良いでしょう。定植後2～3日すると活着し主枝が立つてきます。これを過ぎてても活着が悪いようなら、1株あたり200mlほど鉢元かん水をすると良いでしょう。
【アスパラガス】（露地栽培）
一、茎葉処理
前年の茎葉を整理し、ほ場から搬出するようにしましょう。特に斑点病や茎枯病などが発生したほ場では、できるだけ被害を残さないようにしましょう。
二、春肥
春肥は、直接春芽の収量には影響しませんが、収穫後の生育が良くなりますので、必ず全面に施用しましょう。施用量は、窒素成分で6kg/10a程度です。
三、病害虫防除
収穫した若茎に曲がりや奇形が多い場合、地中や地際でヨトウムシ等の被害を受けていることが考えられます。このような場合は防除を実施しましょう。

●花き
一、小菊（トンネル）の管理
定植は、排水の良好なほ場では平床とし、地下水位の高いほ場は、高畝とします。
一株当たりの仕立て本数は3～4本を目標に整理します。トンネルの保温時期は5月下旬までを目安とします。5月中旬下旬はトンネル内が高湿になりやすいので、やけが発生しないように換気を行います。
二、ラークスバーの定植
立枯性病害が発生しやすいので、過去に発生したほ場では土壌消毒を行います。施肥量は、10アール当たり窒素・磷酸・加里とも10キロとします。施肥量が多い場合は、生育中期に生長点の腐敗が多く発生しやすいので注意が必要です。
三、りんどうの仕立て法
定植2年目以降の株は、茎立ち本数が多くなり、放任すると品質が低下するので茎整理を行います。
①ハイジ系
良茎を1株当たり10本残し、その他の茎は地際から3～4センチ残して折り取ります。ハイジ系は分枝性が強いので、茎を長く残すと分枝が多く発生し通風性が悪くなります。
②ながの系・しなの系
今月に1回目の整理をし、その後、6月に2回目の整理を行います。1回目は草丈が10センチになったら1株当たり15本程度に整理します。2回目は30センチになった頃に良茎を7～9本残し、整理する茎は先端を5センチ程度つみ取ります。

理事会だより

第三回 理事会議案

(四月二十五日開催)

付議第一号 行政庁に提出する業務報告書及び連結業務報告書について
付議第二号 北海道貸付金・就農支援資金(就農施設等資金)の転貸による借入、貸付について
付議第三号 組合員のクミカン取引及び証書貸付に係る理事の連帯保証人の承認について

付議第四号 理事に対する貯金担保貸付及び共済担保貸付の包括承認について

付議第五号 役員と組合の取引基準について

付議第六号 出資金持分譲渡及び減口の承認について

報告第一号 平成二十年三月末現在組合員の動向について

報告第二号 平成二十年三月末現在財務状況について

報告第三号 平成二十年三月末現在事業計画・実績対比について

報告第四号 平成十九年度農協経営分析結果について

報告第五号 理事に対する共済担保貸付について

報告第六号 ゴールデンウィークの業務対応について

報告第七号 月形町水田農業ビジョンの見直し及び平成二十年産地づくり交付金(案)について

こんにちは農民連-4月-

- 2日・農民連盟第34回定期総会 常任委員全員
- 4日・盟友 浅野家葬儀 副委員長
- 7日・拡大執行委員会 四役
 - ・空知農民政治力結集連絡会議定期総会 四役
- 14日・小平忠正月形町後援会総会 四役
- 18日・月形町水田農業推進協議会幹事会 書記長
 - ・月形町農業改良協会幹事会 書記長
 - ・盟友 石川晃弘宅葬儀 事務局
- 23日・月形町水田農業推進協議会監査 委員長
 - ・南幌町農民協議会書記次長藤田宅葬儀 書記長
- 24日・盟友 金子秀次宅葬儀 委員長
- 25日・第2回常任委員会 委員長
- 28日・月形町水田農業推進協議会総会
 - 委員長・書記長
 - ・月形町農業改良協会総会 委員長・書記長

ホクレン ♪スタンド情報♪

ハイオク	170	円/ℓ(税込み)
レギュラー	160	円/ℓ(税込み)
軽油	140	円/ℓ(税込み)
灯油	99	円/ℓ(税込み)

(5月1日現在)

農協文庫 5月号 新刊のお知らせ

今月の農協文庫の新刊をお知らせします。

買取り・貸出しを行っていますので、詳しくは、営農推進課まで連絡下さい。

農村版コミュニティ・ビジネスのすすめ

石田正昭 編著

地域の人材や資源、ノウハウなどを活用して、農山村のコミュニティを活性化させる方策を探る。先進事例を交え、成功へのカギとなる自治体および「中間支援組織」と、両者をまとめるJA組織の役割についても詳解。

はじめてでも簡単 スイレンとハスの育て方・楽しみ方

岩見悦明 著

風情ある花で、涼を呼ぶスイレンとハスの人気品種を約50種ずつ紹介。基礎知識から手軽に庭・ベランダで育てて楽しむ方法、栽培の疑問までやさしく解説。スイレンとハスの図鑑としても活用できる充実の内容。

子育てがラクになる クッキングセラピー

吉原ひろこ 著

学校給食の調査を続けるなかで、親子のコミュニケーション不足を感じた著者が提唱する「クッキングセラピー」の実践ガイド。親子いっしょに食事の準備をすることで、台所を通じて子どもの心に近づくことがたいせつ。

ばあばに教わる 和のごはん

鈴木登紀子 著

“ばあば”こと鈴木登紀子さんがいていねいに教える、四季のとおきおきの献立。旬を生かした、定番の和食から簡単なおかずやおもてなし料理、酒の肴やスイーツまで、季節の味付け・盛付けの工夫とともに写真で解説。

野菜がからだに効く! この食べ方が自然治癒力を高める

池田好子 著

病気の予防と症状の改善に役立つ62種の野菜を緑・赤・白・黄・黒の5色に分類し、旬や栄養成分・身体への効能を解説。野菜の力を最大限に引き出すオリジナルレシピ付。健康長寿の秘訣は野菜の食べ方にあり。

JAが変わる「創発」を生む時代の農協組織論

石田信隆 著

JA批判や組合員の世代交代、担い手層のJA離れ…。このような情勢下でJAが生き残るための方策とは。農林金融の専門家が「創発」をキーワードに、具体的な事例を織り交ぜながら平易に解説する。